

- Auszugsweiser oder vollständiger Nachdruck mit Quellenangabe (Herausgeber und Titel) gestattet
Riproduzione parziale o totale autorizzata con la citazione della fonte (titolo ed edizione)
 - Sped. in a.p. - Art. 2, comma 20/c legge 662/96 (Bolzano)
 - Halbmonatliche Druckschrift, eingetragen mit Nummer 10 vom 06.04.89 beim Landesgericht Bozen
Verantwortlicher Direktor: Dr. Alfred Aberer
Gedruckt auf Recyclingpapier - Druck: LA BODONIANA, BZ
- Publicazione quindicinale iscritta al Tribunale di Bolzano al n. 10 del 06.04.89
Direttore responsabile: Dr. Alfred Aberer
Stampato su carta riciclata - Stampa: LA BODONIANA, BZ

E-mail: astat@provinz.bz.it
astat@provincia.bz.it



astat

info rmation
rmazioni

Nr. 09 April / Aprile 2005

Freiwillige Schwangerschaftsabbrüche und Fehlgeburten in Südtirol

2004

Schwangerschaftsabbrüche

Zunahme der freiwilligen Schwangerschaftsabbrüche: **+10,9%**

Im Jahr 2004 sind in den Gesundheitseinrichtungen Südtirols 582 freiwillige Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt worden. 80,1% der betroffenen Frauen hatten ihren Wohnsitz in Südtirol. Bei 25,1% handelte

Interruzioni volontarie di gravidanza e aborti spontanei in provincia di Bolzano

2004

Interruzioni volontarie di gravidanza


Incremento degli interventi di interruzione volontaria di gravidanza: **+10,9%**

Gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza praticati nel corso del 2004 nelle strutture sanitarie della provincia di Bolzano sono stati 582. Di questi, l'80,1% ha riguardato donne residenti nel territorio

Graf. 1

In Südtirol durchgeführte freiwillige Schwangerschaftsabbrüche und Fehlgeburten - 1987-2004

Interruzioni volontarie di gravidanza e aborti spontanei effettuati in provincia di Bolzano - 1987-2004



es sich um Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die zum Großteil aus den osteuropäischen Ländern kamen, was die steigende Tendenz der Einwanderungen bestätigt.

Insgesamt sind die freiwilligen Schwangerschaftsabbrüche im Vergleich zum Vorjahr um 10,9% gestiegen. Die Abbruchziffer betrug landesweit 5,1 je 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter (15-49 Jahre), was einem Anstieg von 0,5 Punkten verglichen mit dem Jahr 2003 entspricht. Die Abbruchquote hingegen lag im Jahr 2004 auf Landesebene bei 106,8 gegenüber 232,4 auf nationaler Ebene (2003).

Frauen, die in Südtirol eine gesetzlich erlaubte Abtreibung vornehmen lassen, sind zum Großteil ledig (56,0%). 42,1% hingegen sind verheiratet. 64,3% der Frauen sind erwerbstätig, bei 24,2% handelt es sich um Hausfrauen und bei 10,3% um Studentinnen.

Im Jahr 2004 hatten 42,8% der Frauen zum Zeitpunkt des freiwilligen Schwangerschaftsabbruchs keine Kinder, 23,9% hatten bereits ein Kind und 33,3% mehr als ein Kind. 18,6% gaben an, vorher bereits mindestens ein Mal abgetrieben zu haben, und 13,1% hatten mindestens eine Fehlgeburt erlitten.

Fast eine von zehn Frauen war über 40 Jahre alt

Eine Auswertung der Daten nach Altersklassen hat ergeben, dass Frauen im Alter zwischen 25 und 34 Jahren am häufigsten (46,0%) einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Von den gesamten freiwilligen Schwangerschaftsabbrüchen waren 8,9% der Frauen über 40 Jahre alt, während Frauen unter 20 Jahren 7,7% ausmachten.

Schwangerschaftsabbruch um die zehnte Schwangerschaftswoche

Der Anteil der freiwilligen Schwangerschaftsabbrüche, die innerhalb der zehnten Schwangerschaftswoche vorgenommen wurden, ist von 64,2% im Jahr 2003 auf 70,8% im Jahr 2004 angestiegen. Bei jüngeren Frauen kommt es häufiger vor, dass der Eingriff nach der zehnten Schwangerschaftswoche durchgeführt wird: 2004 traf dies auf 31,2% der bis 24-Jährigen und auf 28,6% der über 25-Jährigen zu.

Die Wartezeiten sind für die Effizienz der Gesundheitsdienste besonders aussagekräftig: 43,7% der Schwangerschaftsabbrüche wurden innerhalb von 14 Tagen und 53,7% innerhalb von drei bzw. vier Wochen nach Ausstellung der ärztlichen Bewilligung durchgeführt.

Auch im Jahr 2004 wurde die ärztliche Bewilligung für den Schwangerschaftsabbruch vorwiegend vom gynäkologischen Dienst, der den Eingriff durchführt, (64,1%) und vom Vertrauensarzt (32,1%) erteilt. Nur 3,8% der ärztlichen Bewilligungen wurden von der Beratungsstelle ausgestellt.

provinciale. A conferma dei crescenti fenomeni migratori il 25,1% delle donne aveva nazionalità straniera (in maggioranza provenienti dai paesi dell'Europa dell'Est).

Complessivamente rispetto all'anno precedente si è riscontrato un aumento del 10,9% del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. Il tasso di abortività provinciale è risultato pari a 5,1 ogni 1.000 donne in età feconda (15-49 anni) con un incremento di 0,5 punti rispetto al 2003. Il rapporto di abortività, invece, nel 2004 è risultato pari a 106,8 a livello provinciale, contro 232,4 a livello nazionale (dato 2003).

Le donne che ricorrono all'aborto legale in provincia di Bolzano sono in prevalenza nubili, con una percentuale pari al 56,0% contro il 42,1% delle coniugate. Il 64,3% delle donne risulta nella posizione di occupata, il 24,2% casalinga e il 10,3% studentessa.

Nel 2004 il 42,8% delle donne, al momento dell'interruzione volontaria di gravidanza, non aveva figli, mentre il 23,9% aveva un figlio ed il 33,3% più di un figlio. Il 18,6% ha dichiarato di aver interrotto, in passato - almeno una volta - volontariamente la gravidanza ed il 13,1% ha subito almeno un aborto spontaneo.

Quasi 1 donna su 10 aveva più di 40 anni

La distribuzione percentuale per classe di età ha evidenziato un maggior ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza tra le donne in età compresa tra i 25 e i 34 anni (46,0%). Sul totale delle interruzioni volontarie di gravidanza l'8,9% ha riguardato donne che avevano più di 40 anni di età, mentre le donne con meno di 20 anni hanno costituito il 7,7%.

Età gestazionale attorno alle 10 settimane

Per epoca gestazionale, si registra un aumento degli interventi effettuati entro la 10^a settimana di gestazione; dal 64,2% del 2003 si è passati al 70,8% del 2004. Si osserva tra le più giovani - fino ai 24 anni - una percentuale più elevata di IVG oltre la 10^a settimana (31,2%), rispetto alle donne con più di 25 anni di età (28,6%).


L'indicazione relativa ai tempi di attesa - significativa dell'efficienza dei servizi - mostra che il 43,7% delle interruzioni volontarie di gravidanza è stato effettuato entro il 14^o giorno dalla certificazione e il 53,7% entro la 3^a o 4^a settimana.

Anche per l'anno 2004 la certificazione di autorizzazione all'effettuazione dell'interruzione volontaria di gravidanza è stata rilasciata prevalentemente dal servizio ostetrico-ginecologico che esegue l'intervento (64,1%), a cui segue il medico di fiducia (32,1%) e solo marginalmente il consultorio (3,8%).

Graf. 2

Freiwillige Schwangerschaftsabbrüche in Südtirol nach Schwangerschaftswoche und Altersklassen der Frau - 2004

Interruzioni volontarie di gravidanza effettuate in provincia di Bolzano per età gestazionale e classe di età della donna - 2004



© astat 2005 - sr

astat

Die Dauer des Krankenhausaufenthaltes betrug bei 96,1% der freiwilligen Schwangerschaftsabbrüche weniger als 24 Stunden.

Per il 96,1% delle interruzioni volontarie di gravidanza la durata della degenza risulta essere inferiore alle 24 ore.

Fehlgeburten

Rückläufige Entwicklung bei den Fehlgeburten: -1,3% gegenüber 2003

Im Jahr 2004 wurden in Südtirol 659 Fehlgeburten, welche eine Einlieferung in eine öffentliche oder private Krankenanstalt erforderlich machten, verzeichnet. Das sind 1,3% weniger als im Vorjahr. Die Fehlgeburtenrate beträgt 120,9 auf 1.000 Lebendgeborene. In 90,7% der Fälle handelt es sich um Frauen, die in Südtirol ansässig sind; 12,3% hingegen sind Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft.

Tab. 1

Fehlgeburten in Südtirol nach Altersklassen der Frau - 1994 und 2004

Aborti spontanei in provincia di Bolzano per classe di età della donna - 1994 e 2004

ALTERSKLASSEN CLASSI DI ETÀ	1994		2004		Prozentuelle Veränderung Variazione percentuale
	Insgesamt Totale	Prozentuelle Verteilung Composizione percentuale	Insgesamt Totale	Prozentuelle Verteilung Composizione percentuale	
Bis 24 Fino a 24	63	11,8	49	7,4	-22,2
25-29	165	30,7	112	17,0	-32,1
30-34	165	30,7	200	30,3	+21,2
35-39	108	20,1	178	27,0	+64,8
40 und mehr 40 e oltre	36	6,7	120	18,3	+233,3
Insgesamt Totale	537	100,0	659	100,0	+22,7

Aborti spontanei

Aborti spontanei in diminuzione: -1,3% rispetto al 2003

Nel 2004 si sono registrati 659 casi di aborto spontaneo, per i quali si sia reso necessario il ricovero in strutture pubbliche o private della provincia di Bolzano, l'1,3% in meno rispetto all'anno precedente. Il relativo rapporto di abortività è pari a 120,9 ogni 1.000 nati vivi. Il 90,7% dei casi riguarda donne residenti in provincia di Bolzano, il 12,3%, invece, donne con cittadinanza straniera.

Nahezu die Hälfte der Frauen war über 35 Jahre alt

Den höchsten Risikofaktor für eine Fehlgeburt stellt das zunehmende Alter der Frauen zum Zeitpunkt der Erstempfangnis dar. 2004 betrug das Durchschnittsalter der Frauen bei einer Fehlgeburt 34 Jahre. 45,2% der Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, waren älter als 34 Jahre, 40,3% davon über 40.

Fehlgeburten um die 10. Schwangerschaftswoche

Auch im Jahr 2004 bestätigt sich, dass Fehlgeburten meistens in den ersten Schwangerschaftswochen auftreten: 89,2% der Schwangerschaften wurden durch den Tod des Fötus bereits in den ersten 12 Schwangerschaftswochen vorzeitig beendet. Die Zahl der Schwangerschaftswochen bis zur Fehlgeburt hält sich konstant und beträgt durchschnittlich 10 Wochen.

Der Eingriff aufgrund einer Fehlgeburt machte in 66,5% der Fälle einen eintägigen Krankenhausaufenthalt (Day Hospital) erforderlich. 25,6% der Frauen hingegen mussten für ein bis zwei Tage stationär aufgenommen werden. In nahezu allen Fällen wurde eine Auskratzung unter Vollnarkose durchgeführt.

Emanuela Albanese

Quasi una donna su due aveva più di 35 anni


Il fattore di rischio più rilevante dell'aborto spontaneo è l'innalzamento dell'età media delle donne al primo concepimento. Nel 2004, quest'ultima si attestava su 34 anni. Il 45,2% delle donne, che hanno subito un aborto spontaneo, aveva più di 34 anni e, di queste, il 40,3% più di 40 anni d'età.

Età media gestazionale attorno alle 10 settimane

Si conferma anche per il 2004 una forte concentrazione del fenomeno dell'abortività spontanea nelle prime settimane di gestazione. L'89,2% delle gravidanze, che sono terminate precocemente per morte del feto, è avvenuto nelle prime 12 settimane di gestazione e il numero di settimane di gestazione si mantiene costante nel tempo attestandosi su un valore medio di 10 settimane.

L'intervento per aborto spontaneo ha richiesto nel 66,5% dei casi una giornata di ricovero con la formula day hospital e nel 25,6% dei casi da uno a due giornate di ricovero con pernottamento. Nella quasi totalità dei casi l'intervento è avvenuto con raschiamento in anestesia totale.

Emanuela Albanese



Glossar

Abbruchziffer: Quotient aus der Zahl der Schwangerschaftsabbrüche und der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter (15-49 Jahre), multipliziert mit 1.000.

Abbruchquote: Quotient aus der Zahl der Schwangerschaftsabbrüche und der Zahl der Lebendgeborenen, multipliziert mit 1.000.

Glossario

Tasso di abortività: quoziente tra il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza e la popolazione femminile in età feconda (15-49 anni), moltiplicata per 1.000.

Rapporto di abortività: quoziente tra il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza e i nati vivi, moltiplicato per 1.000.